



Groninger Apotheken Vereniging

Wijzigingen en errata

Groninger Formularium 13^e editie

Update app juli 2021

ICPC	Naam	Omschrijving wijziging	Pagina
K04 t/m K99.05	Hart en Vaatstelsel	Toegevoegd bij alle betablokkers onder 'V': 'Bouw het gebruik in één tot twee weken geleidelijk af'	76
R96	Astma	Toegevoegd : - na 'Adviseer patiënt om te stoppen met roken': zie P17. - Adviseer de patiënt dagelijks ten minste een half uur matig intensieve beweging, zoals wandelen, fietsen, zwemmen of een andere sport - Adviseer een geïndividualiseerd plan voor elke patiënt. - Bij een goede astmacontrole is SABA-gebruik vrijwel niet nodig; (overmatig) SABA-gebruik > 2/week is een teken van onvoldoende astmacontrole. - 'Antimicrobiële therapie alleen Algemeen ziek zijn': (zie R78/R81). - Formoterol met ICS heeft bij volwassenen het voordeel dat deze zowel als nodig als onderhoudsmedicatie te gebruiken is. - Bij patiënten met milde klachten en seizoensgebonden allergische rhinitis die geen corticosteroïden willen of kunnen gebruiken is montelukast een alternatief als onderhoudsbehandeling. Aanpassing stappen: Volwassenen, kinderen vanaf 12 jaar <ul style="list-style-type: none">• Stap 1: kortwerkende luchtwegverwijder (symptomen minder dan twee keer per maand)<ul style="list-style-type: none">○ Alleen zonodig een lage dosis ICS-formoterol* of SABA* bij klachten	205

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Lage dosis ICS* als SABA* genomen word (tweede optie) • Stap 2: onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroiden (symptomen meer dan twee keer per maand, maar minder dan dagelijks) <ul style="list-style-type: none"> ○ Overstappen op inhalatiecorticosteroiden ○ Dagelijks lage dosis ICS* óf lage dosis ICS-formoterol* bij klachten. ○ Bij onderhoud ICS* en klachten een SABA* met extra dosis ICS*. • Stap 3: onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroiden en langwerkende luchtwegverwijders (symptomen op meeste dagen, meer dan een keer per week wakker met astma) <ul style="list-style-type: none"> ○ Lage dosis ICS/formoterol* als onderhoud óf intermediaire dosis ICS*. ○ Bij klachten: ICS/formoterol* zo nodig óf SABA* met extra dosis ICS*. • Stap 4: Intermediaire dosis ICS/LABA (symptomen op meeste dagen, meer dan een keer per week wakker met astma, verminderde longfunctie) <ul style="list-style-type: none"> ○ Intermediaire tot (tijdelijk) hogere dosis ICS/formoterol* óf hogere dosis ICS* ○ Eventueel aan hoge dosis ICS* tiotropium toevoegen ○ Bij klachten: ICS/formoterol* zo nodig óf SABA* met extra dosis ICS*. • Stap 5: verwijzing longarts <p>* ICS/formoterol: beclometason-formoterol of budesonide-formoterol SABA: salbutamol, terbutaline ICS: budesonide, beclometason, fluticasone</p>	
U14.01	Niersteenkoliek	Gewijzigd: Bij contra-indicaties voor diclofenac: morfina oraal of rectaal in combinatie met een laxans in: Bij contra-indicaties voor diclofenac: kortdurend morfine oraal of rectaal in combinatie met een laxans. Zie A01 voor langdurig gebruik van morfine.	265
X72	Candidiasis urogenitale	Vervallen: Miconazol (tweede keus)	300

		Toegevoegd: Butaconazol (ovule en crème) als tweede keus	
X84.01 (Y99.03)	Chlamydia vrouw	Toegevoegd: 2e bullet bij Doxycycline: rectale chlamydia infecties komen frequent voor als co-infectie bij vrouwen, ook bij afwezigheid anaal seksueel contact. Bij empirische behandeling kan daarom de voorkeur gegeven worden aan doxycycline.	304
X90 (Y72)	Herpes simplex genitalis	Gewijzigd: Bij zwangerschap: aciclovir en valaciclovir (valciclovir toegevoegd) Gewijzigd: Aciclovir: dosering 3 dd 400 mg. Behandelduur primo-infectie en recidief aciclovir: 5 dagen. Immuun-gecompromitteerde patiënten: primo-infectie behandelen met aciclovir 800 mg p.o. 3 x daags gedurende 10 dagen, recidief behandelen met aciclovir 400 mg p.o. 3 x daags gedurende 5 dagen	306
Y74.02	Epididymitis	Toegevoegd: Levofloxacin 500 mg , 1d1t gedurende B: Maag-darmklachten, hoofdpijn, duizeligheid, leveraandoeningen, bloedbeeldafwijkingen, overgevoeligheid (allergie). O: Behandelduur 14 dagen V: Voorzichtigheid is geboden bij verminderde nierfunctie, epilepsie, tendinitis/peesruptuur in de voorgeschiedenis. Z: Mogelijk onveilig bij zwangerschap, raadpleeg literatuur en/of teratologie Informatie Service (TIS). Stoppen bij borstvoeding.	313